

5 Momente-E-Learning-Tool

Auflösung: "Blutdruck messen – schwer"

Zum Schutz der Patienten/Bewohner und des Personals vor der Übertragung von Krankheitserregern, ist beim Messen des Blutdrucks die Händedesinfektion im richtigen Moment in die Behandlung zu integrieren. Hier finden Sie die Behandlungsschritte inkl. der Händedesinfektion in der richtigen Reihenfolge:




Händedesinfektion WHO Moment 1 = VOR Patienten-/Bewohnerkontakt

Warum? Um den Patienten/Bewohner bei der anstehenden Behandlung vor einer Übertragung von Erregern zu schützen, die sich auf den Händen des Personals befinden können.

Händedesinfektion WHO Moment 1 = VOR Patienten-/Bewohnerkontakt

Warum? Um den Patienten/Bewohner bei der anschließenden Weiterbehandlung vor einer Übertragung zu schützen, da durch das Händeschütteln potenziell pathogene Erregern auf die Hände gelangen können.



Händedesinfektion WHO Moment 4 = NACH Patienten-/Bewohnerkontakt

Warum? Um das Personal, den nachfolgenden Patienten/Bewohner und die erweiterte Patienten-/Bewohnerumgebung vor potenziell pathogenen Erregern zu schützen, da es während der Behandlung zur Übertragung von Keimen kommen kann.